

Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı 71. Sayfada Bennet Hareketi'nin anlatıldığı bölüm aşağıdaki şekilde revize edilmelidir.

Bennet açısı ile Bennet hareketinin birbirinden bağımsız olmasının temel sebebi, temporomandibular eklem anatomik yapısı ve hareketin iki farklı bileşenden oluşmasıdır.

Konuyu iki ana bileşen üzerinden şu şekilde açıklayabiliriz:

- **Bennet Hareketi:** Kondilin ve tüm mandibulanın çalışan tarafa doğru hareket ederken kütlelesel olarak yana kayma **miktardır** ve milimetre cinsinden doğrusal bir yer değiştirir. Bu durum, temporomandibular eklem fossa ve kondil başının morfolojik uyumu ile eklem disk kompleksinin esnekliğine bağlıdır.
- **Bennet Açısı:** Denge tarafı kondilinin öne, aşağıya ve içeriye doğru ilerlerken **sagittal düzlemle yaptığı açısal değerdir** ve derece cinsinden bir yönelimin ölçüsüdür.

Neden birbirinden bağımsızdır?

- **Anatomik Yapı Farklılığı:** Kondil başının izlediği eklem eğimine bağlıdır. Ancak kondilin o yol üzerindeki kütlelesel kayma miktarı tamamen eklem fonksiyonel ve aksesuar ligamentlerinin yapısına ve mandibulaya gelen kuvvetlere bağlıdır.
- **Klinik Varyasyon:** Bir hastada eklem yüzeyinin eğimi dik olduğu için **Bennet açısı çok büyük** ölçülebilir; ancak eklem içi bağlar sıkı olduğu veya fossa anatomisi yana kaymayı sınırladığı için **Bennet hareketi milimetrik olarak çok küçük** kalabilir. Tam tersi senaryoda ise açı küçük olmasına rağmen kondil kütlelesel olarak oldukça fazla yana kayabilir.

Sonuç olarak açı bir **eğim** ölçüsüyken, Bennet hareketi bir **fiziksel yer değiştirme** miktarıdır. Farklı anatomik sınırlayıcılara bağlı olduklarından, biri diğerinin doğrudan boyutsal karşılığı değildir.

Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı 91. Sayfada devrilmiş molarda proksimal yarım kuron preparasyonunun anlatıldığı bölüm aşağıdaki şekilde revize edilmelidir.

- Distal tüberküllerde çok az ya da hiç preparasyon yapılmaz.

Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı 131. Sayfada karşılayıcı kolların destek dişlerle olan ideal temas ilişkisinin anlatıldığı bölüm aşağıdaki şekilde revize edilmelidir.

- Eğer dayanak dişin konturları **özel olarak şekillendirilmemişse**, resiprokal kol protez tam olarak oturana ve tutucu kol pasif hale gelene kadar **dişle temas etmez**. Ancak bu durum, her takıp çıkarma sırasında diş üzerine geçici bir devrilme kuvveti binmesine yol açar.
- **İdeal ve gerçek resiprokasyon** ise yerleştirme yoluna paralel hale getirilmiş yüzeyler sayesinde protez takılırken ve çıkarılırken kolların **sürekli temasta kalmasıyla** mümkündür.

Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı 149. Sayfada hareketli bölümlü protezlerde fonksiyonel ölçü yöntemlerinin anlatıldığı bölüm aşağıdaki şekilde revize edilmelidir.

- Applegate Ölçü Yöntemi olarak belirtilen başlık **Selektif Basıncı Ölçü Yöntemi** olarak değiştirilmelidir.